

切除不能な進行・再発胃癌の 3次治療以降における ニボルマブのリアルワールドでの安全性： 日本の市販後調査

監修 | 山口研成 先生

公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科 部長

薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

オプジーボ[®] 点滴静注
20mg, 100mg, 120mg, 240mg

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注)}

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

OPDIVO[®]
(nivolumab)

1. 警告

- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状(息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。(「重要な基本的注意」、「特定の背景を有する患者に関する注意」、「重大な副作用」の項参照)

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

製造販売

小野薬品工業株式会社

プロモーション提携

ブリistol・マイヤーズ スクイブ 株式会社


「警告・禁忌を含む使用上の注意」等はDI頁をご参照ください。

本調査におけるニボルマブの用法及び用量は、現在承認されている用法及び用量と異なります。

切除不能な進行・再発胃癌に対する3次治療以降におけるニボルマブの市販後調査の結果が報告されました。

■ 試験概要

患者内訳



Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反]本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

※1:患者登録票が収集され、適格とされ調査に登録された患者集団、※2:登録症例に含まれる患者で、固定された調査票が収集された患者集団、※3:調査票収集症例に含まれる患者で、重複登録や有害事象の有無が不明、患者登録違反、ニボルマブ未使用などの項目に該当する患者を除いた集団、※4:安全性解析対象集団に含まれる患者で、ニボルマブの使用量・使用期間が不明、総合評価が未記載、がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌患者以外などの項目に該当する患者を除いた集団、※5:抗腫瘍効果が判定不能及び不明の患者を除いた有効性解析対象集団

オプジーボ使用成績調査

がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌

目的	がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌患者に対し、ニボルマブの製造販売後における副作用(有害事象)全般の発現状況を把握し、安全性及び有効性に影響を与えと考えられる要因について検討を行うことを目的とする。
試験デザイン	多施設共同非盲検非介入観察研究(日本の158施設)
登録期間	2017年11月1日～2018年10月31日
対象	2レジメン以上の化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発胃癌/食道胃接合部癌患者654例(安全性解析対象集団:650例、有効性解析対象集団:636例)
方法	・ニボルマブは6週を1サイクルとして、3mg/kgを1日1回又は1回240mgを2週間間隔で点滴静注し、病勢進行や許容できない毒性発現などが認められるまで投与を継続した。 ・2017年11月1日～2018年10月31日に本研究に登録され、ニボルマブ投与開始後6ヵ月間観察された患者のデータが収集された。
評価項目	安全性 ・副作用発現状況 ・副作用の初回発現までの期間 ・患者背景別の副作用発現状況
	有効性 ・総合評価(最良抗腫瘍効果) ・奏効割合(ORR:CR+PR) ・患者転帰(6ヵ月生存率) ・患者背景別のORR
	その他 ・患者背景(ニボルマブ使用開始前のECOG PS、性別、年齢、身長、体重等、胃癌以外の病歴、胃癌の状況、過去に実施した胃癌に対する治療状況)
解析計画	安全性 安全性解析対象集団は、ニボルマブの第III相試験(ATTRACTION-2試験)における有害事象の最低頻度にあたる0.30%(1/330例)の頻度で有害事象を検出するために500例と算定された(検出力:77.74%)。副作用及び有害事象は、安全性解析対象集団においてMedDRA/J(ICH国際医薬用語集日本語版)Ver.22.1の器官別大分類(SOC)及び基本語(PT)を用いて集計し、発現頻度及び発現割合を算出した。また、副作用の初回発現までの期間の中央値(範囲)を算出した。
	有効性 ニボルマブ使用開始6ヵ月間における最良時の抗腫瘍効果は、効果判定対象集団においてRECIST 1.1版に基づく総合評価[完全奏効(CR)、部分奏効(PR)、安定(SD)、進行(PD)、評価不能]に対する頻度及び割合を算出した。最良抗腫瘍効果がCRまたはPRの患者を「奏効」と定義し、奏効割合(ORR:CR+PR)を算出した。また、Kaplan-Meier法を用いて生存曲線を推定し、ニボルマブ使用開始6ヵ月後の生存率及びその95%信頼区間を正確法により推定した。
	サブグループ解析 安全性:安全性解析対象集団での副作用発現率は、Fisherの正確率検定、Wilcoxonの順位検定、 χ^2 検定により患者背景別に群間比較を行った。また、ニボルマブの投与回数(5回以上 vs 4回以下)で調整したロジスティック回帰分析による多変量解析を行い、副作用発現率と患者背景の関連性を検討した。有効性:効果判定対象集団でのORRは、安全性と同様の解析法により患者背景別に群間比較を行った。また、安全性と同様にロジスティック回帰分析による多変量解析を行い、ORRと患者背景の関連性を検討した。
本研究の限界	・臨床試験のように正確な臨床情報は収集されておらず、観察期間は6ヵ月と短い ・バイオマーカー解析は実施していない ・サブグループ間の比較は評価・収集外の因子の影響を受けた可能性がある ・病変の部位や組織学的分化度は複数回評価した患者がいるため、これらの因子が多変量解析は実施していない

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反]本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。
オプジーボ使用成績調査結果報告書(がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌)

■ 患者背景 (安全性解析対象集団)

安全性解析対象集団650例の患者背景は以下のとおりでした。

n (%)		n=650	n (%)		n=650
年齢(歳)	15~65未満	183 (28.2)	病変の部位 ^{※1}	食道胃接合部	94
	65~75未満	301 (46.3)		胃	543
	75以上	166 (25.5)		その他	8
	65以上	467 (71.9)	不明	7	
	75未満	484 (74.5)	手術歴	なし	266 (40.9)
性別	男性	474 (72.9)	あり	384 (59.1)	
	女性	176 (27.1)	組織型 ^{※1,2}	高分化腺癌	343
ECOG PS	0	265 (40.8)		低分化腺癌	385
	1	320 (49.2)		その他	7
	2	55 (8.5)		不明	4
	3	10 (1.5)	HER2	陰性	469 (72.2)
	4	0		陽性 ^{※3}	127 (19.5)
	0-1	585 (90.0)		不明	54 (8.3)
	2-4	65 (10.0)	腹膜転移	なし	299 (46.0)
喫煙歴	喫煙者	338 (52.0)	あり	351 (54.0)	
	非喫煙者	238 (36.6)	腹水量	なし、または少量	528 (81.2)
	不明	74 (11.4)		大量	115 (17.7)
				不明	7 (1.1)
併存症の既往・現病歴	なし	221 (34.0)	NLR	2.5未満	321 (49.4)
	あり	428 (65.8)		2.5以上	320 (49.2)
	不明	1 (0.2)		不明	9 (1.4)
腎疾患の既往・現病歴	なし	610 (93.9)	CRP(mg/dL)	1.0未満	431 (66.3)
	あり	39 (6.0)		1.0以上	195 (30.0)
	不明	1 (0.2)		不明	24 (3.7)
肺疾患の既往・現病歴	なし	591 (90.9)	グラスゴー予後スコア	0	434 (66.8)
	あり	58 (8.9)		1	39 (6.0)
	不明	1 (0.2)		2	151 (23.2)
甲状腺疾患の既往・現病歴	なし	607 (93.4)		不明	26 (4.0)
	あり	41 (6.3)			
	不明	2 (0.3)			

※1: 病変の部位と組織学的分化度は、症例報告書において複数のカテゴリーが記載された症例がいたため、総数が安全性解析対象集団を上回っている

※2: 高分化腺癌は乳頭腺癌および管状腺癌を含み、低分化腺癌は印環細胞癌および粘液癌を含む

※3: IHC3+またはIHC2+かつFISH+

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反] 本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

4. 効能又は効果(一部抜粋)

治癒切除不能な進行・再発の胃癌

6. 用法及び用量(一部抜粋)〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

■ 副作用発現状況（安全性評価項目）

- 安全性解析対象集団650例中、副作用は全Gradeで31.5%（205例）、Grade 3以上で11.2%（73例）に認められました。重篤な副作用は11.8%（77例）に認められました。
- 主な副作用は、全Gradeでは甲状腺機能低下症4.2%、下痢3.7%、食欲減退2.9%など、Grade3以上では食欲減退及び下痢各0.9%などが認められました。
- 副作用の初回発現までの期間中央値は32日（範囲：1-178）でした。
- 重篤な副作用の事象名、投与中止に至った副作用の発現率、事象名は論文中に記載がありませんでした。
- ニボルマブとの関連性が否定できない死亡は6例（7事象）でした（肺塞栓症、多臓器機能不全症候群及び腸管虚血、肺炎、脳梗塞、間質性肺疾患、肺障害）¹⁾。

副作用発現状況

n	Grade 1-2	Grade 3-5
胃腸障害*	31	13
臨床検査値異常*	28	10
内分泌障害*	31	6
皮膚および皮下組織障害	35	3
一般・全身障害および投与部位の状態	28	5
代謝および栄養障害	16	12
呼吸器、胸郭および縦隔障害	12	9
神経系障害	6	7
筋骨格系および結合組織障害	8	2
肝胆道系障害	3	7
感染症および寄生虫症*	2	7
血液およびリンパ系障害*	4	4
傷害、中毒および処置合併症	3	1
腎および尿路障害	2	1
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリームを含む）	1	1
生殖系および乳房障害	1	0
血管障害	0	1
耳および迷路障害	1	0
眼障害	1	0

※胃腸障害、内分泌障害では各2例、臨床検査値異常、感染症および寄生虫症、血液およびリンパ系障害では各1例、Gradeが不明の症例を含む副作用はMedDRA/J Ver. 22.1を用いて集計し、GradeはCTCAE v4.0またはv5.0を用いて評価しました。

1) オプジーボ使用成績調査結果報告書（がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌）

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

【利益相反】本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

■ 患者背景別の副作用発現状況（安全性評価項目・サブグループ解析）

多変量解析の結果、腹膜転移なし、肺疾患や甲状腺疾患、腎疾患などの併存疾患の既往・現病歴を有する患者で副作用発現率が上昇することが示されました。

患者背景別の副作用の多変量解析（安全性解析対象集団）

	背景因子	オッズ比(95%CI) ^{※1}	p値 ^{※2}
年齢(歳)	65～75未満 vs 15～65未満	1.20 (0.80-1.80)	0.3902
	75以上 vs 15～65未満	1.44 (0.91-2.28)	0.1172
	65以上 vs 65未満	1.28 (0.87-1.87)	0.2050
	75以上 vs 75未満	1.29 (0.88-1.87)	0.1872
ECOG PS	2-4 vs 0-1	0.76 (0.41-1.38)	0.3621
喫煙歴	喫煙者 vs 非喫煙者	1.13 (0.79-1.62)	0.5131
併存症の既往・現病歴	あり vs なし	1.52 (1.05-2.19)	0.0259*
腎疾患の既往・現病歴	あり vs なし	2.19 (1.14-4.20)	0.0189*
肺疾患の既往・現病歴	あり vs なし	2.17 (1.26-3.74)	0.0055*
甲状腺疾患の既往・現病歴	あり vs なし	2.05 (1.08-3.89)	0.0287*
腹膜転移	あり vs なし	0.72 (0.51-1.00)	0.0494*
胃癌/食道胃接合部癌に対する手術歴	あり vs なし	1.38 (0.97-1.94)	0.0708
病変の部位:食道胃接合部	あり vs なし	1.03 (0.64-1.65)	0.9050
病変の部位:胃	あり vs なし	0.98 (0.63-1.53)	0.9216
病変の部位:その他	あり vs なし	1.37 (0.32-5.80)	0.6728
組織型:高分化腺癌 ^{※3}	あり vs なし	1.28 (0.92-1.79)	0.1494
組織型:低分化腺癌 ^{※4}	あり vs なし	0.82 (0.59-1.15)	0.2543
組織型:その他	あり vs なし	1.46 (0.32-6.64)	0.6221
腹水量	大量 vs なし、または少量	0.70 (0.44-1.11)	0.1310
CRP (mg/dL) ^{※5}	1.0以上 vs 1.0未満	0.74 (0.50-1.10)	0.1364
グラスゴー予後スコア ^{※4}	1 vs 0	0.87 (0.59-1.28)	0.4730
	2 vs 0	0.65 (0.40-1.06)	0.0815
NLR ^{※4}	2.5以上 vs 2.5未満	0.81 (0.57-1.13)	0.2159

※1:ニボルマブの投与回数(5回以上 vs 4回以下)で調整したロジスティック回帰分析

※2:Fisherの正確検定、Wilcoxon順位和検定、 χ^2 検定

※3:高分化腺癌は乳頭腺癌および管状腺癌を含む

※4:低分化腺癌は印環細胞癌および粘液癌を含む

※5:ニボルマブ投与開始前2週間以内

*:p<0.05は統計学的に有意差があるとみなされた

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反]本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

■ 総合評価及び患者転帰（有効性評価項目）

- 効果判定対象集団におけるRECIST 1.1版に基づく評価では、最良抗腫瘍効果はCR6例、PR52例、SD140例、PD301例であり、奏効割合（ORR：CR+PR）は11.2%（58/516例）でした。
- 6ヵ月時点の生存率は52.0%でした（Kaplan-Meier法）。

最良抗腫瘍効果及び6ヵ月生存率（有効性評価項目・効果判定対象集団）

最良抗腫瘍効果 ^{※1} 、n(%)	
CR	6 (1.2)
PR	52 (10.1)
SD	140 (27.1)
PD	301 (58.3)
評価不能	17 (3.3)
ORR ^{※1}	11.2% (58/516)
6ヵ月生存率 ^{※2}	52.0%

※1: RECIST 1.1版

※2: Kaplan-Meier法

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反]本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

多変量解析の結果、ORRは65歳以上で13.9%、65歳未満で5.3%、75歳以上で18.8%、75歳未満で9.2%でした。

患者背景別のORRの多変量解析（有効性評価項目・サブグループ解析：効果判定対象集団）

背景因子		オッズ比(95%CI) ^{※1}	p値 ^{※2}
年齢(歳)	65～75未満 vs 15～65未満	2.19 (0.91-5.26)	0.0810
	75以上 vs 15～65未満	3.83 (1.55-9.47)	0.0036*
	65以上 vs 65未満	2.74 (1.19-6.31)	0.0178*
	75以上 vs 75未満	2.18 (1.21-3.94)	0.0097*
ECOG PS	2-4 vs 0-1	1.24 (0.34-4.53)	0.7448
喫煙歴	喫煙者 vs 非喫煙者	1.86 (0.99-3.47)	0.0525
NLR ^{※3}	2.5以上 vs 2.5未満	1.20 (0.68-2.13)	0.5355

※1: ニボルマブの投与回数(5回以上 vs 4回以下)で調整したロジスティック回帰分析

※2: Fisherの正確検定、Wilcoxon順位和検定、 χ^2 検定

※3: ニボルマブ投与開始前2週間以内

*: p<0.05は統計学的に有意差があるとみなされた

Yamaguchi K et al.: Gastric Cancer 2022; 25(1): 245-253

[利益相反]本研究は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

本試験におけるニボルマブの用法及び用量は、現在承認されている用法及び用量と異なります。

■ 国際共同第III相試験 (ATTRACTION-2試験)

小野薬品工業：国際共同第III相 (ONO-4538-12) 試験成績 (社内資料) 承認時評価資料
 Kang YK et al.: Lancet 2017; 390 (10111): 2461-2471 Boku N et al.: Gastric Cancer 2021 24(4): 946-958
 [利益相反] 本試験は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

目的	2つ以上の化学療法歴を有する標準治療に不応又は不耐の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)を対象に、オプジーブ群のプラセボ群に対する優越性を検証するとともに、安全性も検討する。	
試験デザイン	多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較第III相試験	
対象	2つ以上の化学療法歴を有する標準治療に不応又は不耐の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)患者493例(日本人226例)[ニボルマブ群:330例(日本人152例)、プラセボ群:163例(日本人74例)]	
投与方法	6週を1サイクルとして、ニボルマブ3mg/kgを1日1回、またはプラセボとして生理食塩液をそれぞれ2週間間隔で点滴静注した。	
評価項目	有効性	主要評価項目:全生存期間(OS) 副次評価項目:無増悪生存期間(PFS)、奏効率(ORR)[RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、奏効期間(DOR)、病勢制御率(DCR)、奏効に至るまでの期間(TTR)、最良総合効果(BOR)、標的病変の腫瘍径の変化率
	安全性	有害事象、臨床検査等
解析計画 有効性	主要 評価項目	OSは、必要イベント数261件の約75%のイベント(196件)が発生した時点で、事前の計画に従って中間解析を実施し、再算定後の必要イベント328件が発生した時点で最終解析を実施した。割付因子を層別因子とした層別log-rank検定(片側有意水準2.5%)により投与群間の比較を行った。さらに、主たる解析の感度分析として、log-rank検定による投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子とした層別Cox比例ハザードモデルを用いて、ニボルマブ群のプラセボ群に対するハザード比及びその両側95%信頼区間を算出した。Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間と、3、6、9、12、18、24及び36ヵ月時点の生存率及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。
	副次 評価項目	PFSは、割付因子を層別因子とした層別log-rank検定により投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子とした層別Cox比例ハザードモデルを用いて、ニボルマブ群のプラセボ群に対するハザード比及びその両側95%信頼区間を算出した。Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間と、3、6、9、12、18、24及び36ヵ月時点のPFS率及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。ORR及びDCRに対して、割合及びその両側95%信頼区間(Clopper-Pearson法)を投与群ごとに算出した。割付因子を層別因子としたCochran-Mantel-Haenszel(CMH)検定により投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子としたCMH法を用いて、ニボルマブ群のプラセボ群に対するオッズ比及びその両側95%信頼区間、並びにリスク差及びその両側95%信頼区間を算出した。DORについて、Kaplan-Meier曲線を投与群ごとに表示した。またBORがCR又はPRの症例を対象に、Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。TTRは、Kaplan-Meier曲線を投与群ごとに表示し、要約統計量を投与群ごとに算出した。
	サブ グループ 解析	解析計画の有効性で設定された評価項目において規定された日本人部分集団を対象としたサブグループ解析を行った。また、事前に規定された実施国、年齢、性別、PS、再発の有無、病変の部位、組織型、肉眼型、転移臓器の数、腹膜転移の有無、肝転移の有無、標的病変の有無、前治療(手術・放射線療法)の有無及び前治療レジメン数を層別因子とし、OSのサブグループ解析を行った。なお、探索的解析として、PD-L1発現状況別のOSのサブグループ解析が事前に規定されていた。

■ 安全性

本試験において、副作用はニボルマブ群で42.7% (141/330例)、プラセボ群で26.7% (43/161例)に認められました。主な副作用(5%以上)は、ニボルマブ群では、そう痒症9.1% (30例)、下痢7.0% (23例)、発疹5.8% (19例)、疲労5.5% (18例)で、プラセボ群では、そう痒症及び疲労各5.6% (9例)でした。

重篤な副作用はニボルマブ群10.0% (33例)、プラセボ群5.0% (8例)に認められ、主なもの(2例以上)はニボルマブ群では、間質性肺疾患0.9% (3例)、大腸炎、発熱、肺炎、尿路感染及び糖尿病性ケトアシドーシス各0.6% (2例)でした。プラセボ群では、2例以上に発現した重篤な副作用は認められませんでした。

投与中止に至った副作用は、ニボルマブ群2.7% (9例)、プラセボ群2.5% (4例)に認められ、主なもの(2例以上)はニボルマブ群の間質性肺疾患0.9% (3例)でした。プラセボ群では2例以上に発現した投与中止に至った副作用は認められませんでした。

死亡に至った副作用は、ニボルマブ群では心停止、死亡、急性肝炎※、肺炎及び労作性呼吸困難が各0.3% (1例)、プラセボ群では消化管穿孔及び突然死が各0.6% (1例)でした。(承認時)


※:急性肝炎の1例は基準日(最終投与後28日又は後続のがん治療開始日)以降に転帰が死亡となっています。

小野薬品工業：国際共同第III相 (ONO-4538-12) 試験成績 (社内資料) 承認時評価資料

■ 全生存期間 (主要評価項目)

1年生存率はニボルマブ群27.3%、プラセボ群11.6%であり、2年および3年生存率はそれぞれ10.6%および5.6%、3.2%および1.9%でした。


初回報告^{2,3)}



2) 小野薬品工業: 国際共同第III相 (ONO-4538-12) 試験成績 (社内資料) 承認時評価資料

3) Kang YK et al.: Lancet 2017; 390 (10111): 2461-2471 Boku N et al.: Gastric Cancer 2021 24(4): 946-958
[利益相反] 本試験は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

3年フォローアップ解析⁴⁾



Kaplan-Meier曲線上のマークは打ち切り例を示す。

*1: Kaplan-Meier法 *2: 層別Cox比例ハザードモデル *3: IWRSのデータに基づく割付因子 (実施国, ECOG PS, 転移臓器数) を層別因子とした。*4: 層別log-rank検定

4) Boku N, et al.: Gastric Cancer 2021; 24(4): 946-958

[利益相反] 本試験は小野薬品工業株式会社およびBristol-Myers Squibbの資金提供を受けて実施された。

4. 効能又は効果 (一部抜粋)

治療切除不能な進行・再発の胃癌

6. 用法及び用量 (一部抜粋) (治療切除不能な進行・再発の胃癌)

通常、成人にはニボルマブ (遺伝子組換え) として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ (遺伝子組換え) として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

薬価基準収載

オプジーボ[®] 点滴静注 20mg・100mg・120mg・240mg

OPDIVO[®] I.V. Infusion

貯法：2～8℃で保存

有効期間：36箇月

最適使用推進ガイドライン対象品目

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

	承認番号	販売開始	薬価収載
20mg	22600AMX00768000	2014年9月	2014年9月
100mg	22600AMX00769000		
120mg	30200AMX00925000	2020年11月	2020年11月
240mg	23000AMX00812000	2018年11月	2018年11月

1. 警告

1. 1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
1. 2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状(息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、9.1.2、11.1.1参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オプジーボ 点滴静注 20mg	オプジーボ 点滴静注 100mg	オプジーボ 点滴静注 120mg	オプジーボ 点滴静注 240mg	
有効成分	ニボルマブ(遺伝子組換え) ^{注1)}				
含量/容量 ^{注2)} (1バイアル中)	20mg/2mL	100mg/10mL	120mg/12mL	240mg/24mL	
添加剤	D-マンニトール	60mg	300mg	360mg	720mg
	クエン酸ナトリウム水和物	11.76mg	58.8mg	70.6mg	141mg
	塩化ナトリウム	5.84mg	29.2mg	35.0mg	70.1mg
	ジエチレントリアミン五酢酸	0.01576mg	0.0788mg	0.0946mg	0.189mg
	ポリソルベート80	0.4mg	2mg	2.4mg	4.8mg
	pH調節剤 2成分	適量	適量	適量	適量

注1) 本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

注2) 本品は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は各々22mg/2.2mL、105mg/10.5mL、126mg/12.6mL、246mg/24.6mLである。

3.2 製剤の性状

販売名	オプジーボ 点滴静注20mg	オプジーボ 点滴静注100mg	オプジーボ 点滴静注120mg	オプジーボ 点滴静注240mg
剤形	注射剤(バイアル)			
pH	5.5～6.5			
浸透圧比	約1.2(生理食塩液対比)			
性状	無色～微黄色の澄明又は乳白光を呈する液。微粒子をわずかに認めることがある。			

4. 効能又は効果

- 悪性黒色腫
- 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
- 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
- 治療切除不能な進行・再発の胃癌
- 切除不能な進行・再発の悪性胸腺中皮腫
- がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
- がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
- 食道癌における術後補助療法

* ○原発不明癌

5. 効能又は効果に関連する注意

(悪性黒色腫)

5. 1 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.1-17.1.7参照]
5. 2 根治切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
5. 2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.9-17.1.11参照]
5. 3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 3 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
5. 4 化学療法未治療患者に対してイビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合、IMDC^{注)}リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。
5. 5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 6 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.12-17.1.14参照]
5. 6 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
5. 7 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.15-17.1.17参照]
5. 7 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
5. 8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。
5. 9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 10 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.18参照]
5. 10 治療切除不能な進行・再発の胃癌
5. 11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 11 切除不能な進行・再発の悪性胸腺中皮腫
5. 12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 12 がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
5. 13 フッ化ビリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5. 14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/001.html>
5. 15 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.24参照]
5. 16 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 16 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
5. 17 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
5. 18 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.25参照]
5. 18 食道癌における術後補助療法
5. 19 術前補助療法により病理学的完全奏効(pCR)が認められなかった患者に投与すること。
5. 20 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 21 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCRの定義等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.26参照]

* (原発不明癌)

5. 22 「原発不明がん診療ガイドライン」(日本臨床腫瘍学会)等の最新の情報を参考に、適切な全身検査及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のない患者であることを確認すること。
5. 23 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.27参照]

注) International Metastatic RCC Database Consortium

6. 用法及び用量

(悪性黒色腫)

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治療切除不能な進行・再発の胃癌

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

通常、小児にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回3mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注する。なお、体重40kg以上の小児には、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注することもできる。

* (再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、原発不明癌)

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

切除不能な進行・再発の悪性胸腺中皮腫

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

イビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

イビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、食道癌における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

7. 用法及び用量に関連する注意

(効能共通)

7. 1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。
7. 1 悪性黒色腫
7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場

合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照](**切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌**)

- 7.3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。
- 7.4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した上で選択すること。[17.1.10参照](**根治切除不能又は転移性の腎細胞癌**)
- 7.5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。
(**再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫**)
- 7.6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
(**再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌**)
- 7.7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
(**治癒切除不能な進行・再発の胃癌**)
- 7.8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立していない。
- 7.9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。
- 7.10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(CPS)により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判断すること。[17.1.20参照]
- 7.11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17.臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。[17.1.20、17.1.21参照](**切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫**)
- 7.12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。
(**がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌**)
- 7.13 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
(**食道癌における術後補助療法**)
- 7.14 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
(**原発不明癌**)
- 7.15 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意 (効能共通)

- 8.1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。
- 8.2 間質性肺炎があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、臨床症状(呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常(捻髪音)等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2、9.1.2、11.1.1参照]
- 8.3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行うこと。[11.2参照]
- 8.4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渴、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。[11.1.4参照]
- 8.5 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.6参照]
- 8.6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査(TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定)を実施すること。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.7、11.1.8、11.1.11参照]
- 8.7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.10参照]
- 8.8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。また、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.15参照](**切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌**)
- 8.9 本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)を併用投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者
自己免疫疾患が増悪するおそれがある。
- 9.1.2 間質性肺炎のある患者又はその既往歴のある患者
間質性肺炎が増悪するおそれがある。[1.2、8.2、11.1.1参照]
- 9.1.3 臓器移植歴(造血幹細胞移植を含む)のある患者
本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。
- 9.1.4 結核の感染又は既往を有する患者
結核を発症するおそれがある。[11.1.17参照]
- 9.4 生殖能を有する者
妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5参照]
- 9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。妊娠サルを用いた出生前及び出生後の発生に関する試験において、10mg/kgの週2回投与(AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当する)により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認め

られたが、催奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。[9.4参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行するので、本剤も移行する可能性がある。

9.7 小児等

(**悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法、原発不明癌**)
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

(**再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫**)

低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン	接種したワクチンに対する過度な免疫応答に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行うこと。	本剤のT細胞活性化作用による過度の免疫反応が起るおそれがある。
弱毒生ワクチン		
不活化ワクチン		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと¹⁾。

11.1 重大な副作用

11.1.1 間質性肺疾患

肺炎炎、肺浸潤、肺障害等の間質性肺疾患(3.4%、6.1%)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2、8.2、9.1.2参照]

11.1.2 重症筋無力症(0.1%未満、0.1%未満)、心筋炎(0.1%未満、0.2%)、筋炎(0.1%未満、0.3%)、横紋筋融解症(頻度不明、0.1%未満)

これらを合併したと考えられる症例も報告されている。また、重症筋無力症によるクレーゼのため急速に呼吸不全が進行することがあるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。[8.3参照]

*11.1.3 大腸炎(1.1%、3.4%)、小腸炎(0.1%未満、0.2%)、重度の下痢(0.7%、4.0%)

腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

11.1.4 1型糖尿病

1型糖尿病(劇症1型糖尿病を含む)(0.2%、0.4%)があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。1型糖尿病が疑われた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.4参照]

11.1.5 重篤な血液障害

免疫性血小板減少性紫斑病(頻度不明、0.1%未満)、溶血性貧血(頻度不明、0.1%未満)、無顆粒球症(頻度不明、頻度不明)、発熱性好中球減少症(0.1%未満、2.0%)等の重篤な血液障害があらわれることがある。また、本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)との併用において、発熱性好中球減少症(15.8%^{注1})があらわれることがある。[8.9参照]
注1) 発現頻度はONO-4538-52試験から集計した。

*11.1.6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎

劇症肝炎(頻度不明、頻度不明)、肝不全(0.1%未満、0.1%未満)、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、ALP増加、ビリルビン増加等を伴う肝機能障害(0.7%、4.4%)、肝炎(0.3%、1.7%)、硬化性胆管炎(頻度不明、頻度不明)があらわれることがある。[8.5参照]

*11.1.7 甲状腺機能障害

甲状腺機能低下症(7.3%、13.3%)、甲状腺機能亢進症(3.3%、6.7%)、甲状腺炎(0.9%、1.4%)等の甲状腺機能障害があらわれることがある。[8.6参照]

*11.1.8 下垂体機能障害

下垂体炎(0.3%、2.1%)、下垂体機能低下症(0.2%、0.8%)、副腎皮質刺激ホルモン欠損症(0.1%未満、0.1%)等の下垂体機能障害があらわれることがある。[8.6参照]

11.1.9 神経障害

末梢性ニューロパチー(1.2%、20.6%)、多発ニューロパチー(0.1%未満、0.4%)、自己免疫性ニューロパチー(0.1%未満、頻度不明)、ギラン・バレー症候群(0.1%未満、0.1%未満)、脱髄(0.1%未満、頻度不明)等の神経障害があらわれることがある。

11.1.10 腎障害

腎不全(0.5%、1.6%)、尿細管間質性腎炎(0.1%、0.1%)、糸球体腎炎(頻度不明、0.1%未満)等の腎障害があらわれることがある。[8.7参照]

11.1.11 副腎障害

副腎機能不全(0.6%、3.0%)等の副腎障害があらわれることがある。[8.6参照]

11.1.12 脳炎(0.1%未満、0.2%)

11.1.13 重度の皮膚障害

中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)(頻度不明、0.1%未満)、皮膚粘膜炎候群(Stevens-Johnson症候群)(0.1%未満、0.1%未満)、類天疱瘡(0.1%未満、0.1%未満)、多形紅斑(0.1%、0.3%)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。

11.1.14 静脈血栓塞栓症

深部静脈血栓症(0.1%未満、0.4%)、肺塞栓症(0.1%未満、0.4%)等の静脈血栓塞栓症があらわれることがある。

11.1.15 Infusion reaction

アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難、過敏症等を含むInfusion reaction(3.1%、7.8%)があらわれることがある。重度のInfusion reactionがあらわれた場合には直ちに投与を中止して適切な処置を行うとともに、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[8.8参照]

11.1.16 血球貪食症候群(頻度不明、頻度不明)

11.1.17 結核(頻度不明、頻度不明) [9.1.4参照]

11.1.18 膵炎(0.3%、0.7%)

注)「重大な副作用」の発現頻度は、単独投与時、併用投与時の順に記載した。

11. 2 その他の副作用

11. 2. 1 単独投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	貧血、リンパ球減少症、白血球減少症、血小板減少症、好中球減少症	リンパ節症、赤白血球減少、ヘマトクリット減少、白血球増加症、好中球数増加、単球数増加、好酸球増加症、ヘモグロビン減少		単球数減少、好酸球減少
心臓障害		徐脈、心房細動、心室性期外収縮、頻脈、動悸、伝導障害、不整脈、心電図QT延長		心肥大、心不全、急性心不全
耳及び迷路障害				
内分泌障害		高リパーゼ血症	尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性	
眼障害			眼乾燥、ぶどう膜炎、硝子体浮遊物、流涙増加、霧視、視力障害、複視、角膜障害	フォークト・小柳・原田症候群
胃腸障害	下痢、悪心	腹痛、口内乾燥、口内炎、嘔吐、便秘	消化不良、腹部不快感、腹部膨満、腹水、胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、口の感覚鈍麻、口唇炎、胃食道逆流性疾患、放屁、口腔障害、歯肉出血、嚥下障害、流涎過多、胃腸障害、口腔知覚不全、消化管出血	
全身障害	疲労(20%)、無力症	倦怠感、悪寒、浮腫、粘膜の炎症、発熱、インフルエンザ様疾患	口渇、顔面浮腫、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、疼痛、胸痛	
免疫系障害			リウマチ因子増加、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、インターロイキン濃度増加
感染症			癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳炎、歯肉炎、鼻咽喉炎、膿疱性皮膚疹、帯状疱疹、尿路感染、肺感染	
代謝及び栄養障害	食欲減退	高血糖、低ナトリウム血症、高アマラーゼ血症	糖尿病、脱水、高尿酸血症、高カリウム血症、低カリウム血症、高カルシウム血症、低カルシウム血症、高ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症、血中リン増加、低クロール血症、高マグネシウム血症	代謝性アシドーシス、総蛋白減少
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛	筋肉痛	四肢痛、背部痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、関節炎、筋骨格痛、関節腫脹、開口障害、筋縮、シェーグレン症候群、頸部痛、腱炎、関節硬直	
精神・神経系障害		味覚異常、浮動性めまい、頭痛	不眠症、傾眠、記憶障害、感覚鈍麻、不安、感情障害、リビドー減退、うつ病、錯覚	
腎及び尿路障害		高クレアチニン血症	頻尿、蛋白尿、血尿、血中尿素増加、尿沈渣異常、膀胱炎	
呼吸器、胸部及び縦隔障害		呼吸困難、咳嗽	口腔咽頭痛、肺出血、胸水、しゃっくり、喉頭痛、鼻出血、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、咯血、サーファクタントタンパク質増加、低酸素症、気道の炎症、喉頭浮腫、発声障害	
皮膚及び皮下組織障害	そう痒症、発疹	皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮膚疹、湿疹、尋常性白斑、脱毛症	蕁麻疹、中毒性皮膚疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剰、毛髪変色、皮膚色素減少、皮膚腫瘍、皮膚炎、皮膚病変、白斑、酒さ	
血管障害			潮紅、ほてり、高血圧、低血圧、血管炎	
その他		体重減少	硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、細胞マーカー増加、血中CK減少、血中LDH増加、CRP増加、体重増加、血中CK増加、組織織性壊死性リンパ節炎	

11. 2. 2 併用投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	好中球減少症(20.2%)、血小板減少症(15.7%)、貧血、白血球減少症	リンパ球減少症	リンパ節症、白血球増加症、好酸球増加症、ヘマトクリット減少、単球増加症、好酸球減少症、好中球増加症、ヘモグロビン減少、赤白血球減少症	単球数減少
心臓障害			頻脈、不整脈、心不全、心房細動、徐脈、動悸、心電図QT延長	心肥大、急性心不全、心室性期外収縮、伝導障害
耳及び迷路障害				耳不快感
内分泌障害			性腺機能低下、副甲状腺機能低下症	尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性
眼障害		眼乾燥、流涙増加	霧視、ぶどう膜炎、視力障害、硝子体浮遊物、複視、角膜障害、上強膜炎	フォークト・小柳・原田症候群
胃腸障害	下痢(28.7%)、悪心(26.6%)、嘔吐、便秘、口内炎、腹痛	消化不良、口内乾燥	腹部膨満、腹部不快感、胃炎、放屁、胃腸障害、口腔知覚不全、口腔障害、腹水、腸管穿孔、口唇炎、嚥下障害、十二指腸炎、十二指腸潰瘍、消化管出血、歯肉出血、口腔内痛、舌痛、痔核、胃食道逆流性疾患、流涎過多、口の感覚鈍麻	胃潰瘍
全身障害	疲労(22.9%)、発熱、無力感、倦怠感	浮腫、粘膜の炎症、悪寒、インフルエンザ様疾患	顔面浮腫、口渇、疼痛、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、胸痛	

- その他、詳細は製品添付文書をご参照ください。
- 製品添付文書の改訂に十分ご留意ください。

製造販売

小野薬品工業株式会社

〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1-8-2

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先 販売情報提供活動に関するお問い合わせ先

電話 0120-626-190 電話 0120-076-108

プロモーション提携

ブリistol・マイヤーズ スクイブ 株式会社

〒163-1328 東京都新宿区西新宿 6-5-1

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先 販売情報提供活動に関するお問い合わせ先

電話 0120-093-507 電話 0120-487-200

*2021年12月改訂

免疫系障害			リウマチ因子増加、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、インターロイキン濃度増加
感染症		肺感染	気管支炎、気道感染、蜂巣炎、歯肉炎、帯状疱疹、尿路感染、膿疱性皮膚疹、鼻咽喉炎、歯肉炎、爪感染、結膜炎	癰、外耳炎、中耳炎
代謝及び栄養障害	食欲減退(20.4%)、高リパーゼ血症、高アマラーゼ血症	高血糖、低ナトリウム血症、脱水、低カリウム血症、低アルブミン血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低カルシウム血症	糖尿病、高カルシウム血症、高コレステロール血症、高ナトリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、脂質異常症、低クロール血症、代謝性アシドーシス、高カリウム血症、総蛋白減少	高マグネシウム血症、血中リン増加
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛、筋肉痛	関節炎、背部痛、四肢痛、筋縮、筋力低下	筋骨格痛、筋骨格硬直、関節腫脹、頸部痛、椎間関節障害、側腹部痛、筋固縮、関節硬直、リウマチ性多発筋痛、腱炎、頸骨壊死、開口障害	シェーグレン症候群
精神・神経系障害	味覚異常	浮動性めまい、錯覚、不眠症、頭痛、感覚鈍麻	失神、不安、うつ病、傾眠、嗜眠、記憶障害、感情障害、リビドー減退、神経炎、錯乱状態、腓骨神経麻痺	
腎及び尿路障害		血中クレアチニン増加、蛋白尿	頻尿、血尿、血中尿素増加、膀胱炎	尿沈渣異常
呼吸器、胸部及び縦隔障害		咳嗽、呼吸困難、しゃっくり、鼻出血、発声障害	肺出血、気道の炎症、胸水、喉頭痛、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、咯血、低酸素症、サーファクタントタンパク質増加、口腔咽頭痛	喉頭浮腫
皮膚及び皮下組織障害	発疹(18.9%)、そう痒症(18.1%)、丘疹性皮膚疹、脱毛症、手足症候群	皮膚炎、皮膚病変、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、尋麻疹、皮膚乾燥、皮膚色素過剰	白斑、中毒性皮膚疹、乾癬、皮膚色素減少、毛髪変色、苔癬様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑	酒さ
血管障害		高血圧	潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血圧	
その他		体重減少	血中LDH増加、CRP増加、血中CK増加、体重増加、細胞マーカー増加、瘻孔	血中CK減少、硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、組織織性壊死性リンパ節炎

14. 適用上の注意

14. 1 薬剤調製時の注意

1. 1 バイアルは振盪せず、激しく攪拌しないこと。
1. 2 本剤は日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に希釈する。なお、1回240mg、360mg又は480mg投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。
3mg/kg投与時は最終濃度が0.35mg/mL以上となるように希釈する。
1. 3 添加後は静かに混和し、急激な振盪は避けること。
1. 4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後も残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。
1. 5 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。
1. 6 他剤との混注はしないこと。

14. 2 薬剤投与時の注意

本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22µm)を使用すること。

15. その他の注意

15. 1 臨床使用に基づく情報

1. 1 国内外において本剤に対する抗体の産生が報告されている。
1. 2 海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施された症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。

15. 2 非臨床試験に基づく情報

サルに本剤50mg/kgを週1回、4週間反復投与した結果、脈絡叢へのリンパ球及び形質細胞浸潤が認められたとの報告がある。

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

- 1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)
- 2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

- 〈オブジーボ点滴静注20mg〉
2mL[1バイアル]
- 〈オブジーボ点滴静注100mg〉
10mL[1バイアル]
- 〈オブジーボ点滴静注120mg〉
12mL[1バイアル]
- 〈オブジーボ点滴静注240mg〉
24mL[1バイアル]

